

تعميم رقم 132
تعريف حالات الحمى الصفراء
Fièvre jaune (amarile)
Yellow fever

يعتمد التعريف التالي لحالات الحمى الصفراء، الواجب الإبلاغ عنها الى وزارة الصحة العامة، بغضون 24 ساعة من تشخيصها :

<p>حالة مشتبهة (ارتفاع مفاجئ في الحرارة وظهور يرقان بعد مرمو اسبوعين من بدء أولى العوارض، و قد تظهر عوارض نزيف أو قصور في الكلى.</p> <ul style="list-style-type: none">- مع تشخيص مخبري (في مختبر مرجعي):- عزل فيروس الحمى الصفراء- أو ايجابية الفحص المصلي للضد النوعي IgM أو تزايد اقله أربعة أضعاف للضد النوعي IgG في عينات مصلية مزدوجة (جمعت خلال الطور الحاد و طور النقاهة)- أو ايجابية الفحص النسيجي للكبد بعد الوفاة- أو ايجابية فحص المستضد في الانسجة- أو ايجابية فحص تفاعل PCR في عينات من الدم أو الاعضاء.- أو حالة مرتبطة وبائيا بحالة مثبتة مخبريا أو مرتبطة بحدوث فاشية. <p style="text-align: center;">- - -</p> <p>Un cas suspect (installation brutale de fièvre et d'un ictère survenant au cours de 2 semaines qui suivent l'apparition des premiers symptômes avec possibilité de manifestations hémorragiques et des signes d'insuffisance rénale) :</p> <ul style="list-style-type: none">- Avec confirmation de laboratoire (par un laboratoire de référence) :<ul style="list-style-type: none">- Isolement de virus de la fièvre jaune- OU présence d'IgM spécifiques de la fièvre jaune ou multiplication par au moins 4 des niveaux d'IgG dans des sérums appariés (phase aigue et phase de convalescence)- OU examen histopathologique positif du foie (post-mortem)- OU mise en évidence d'antigènes amarils dans les tissus (immunochimie)- OU mise en évidence de séquences génomiques du virus de la fièvre jaune dans le sang ou les organes (PCR).- Ou ayant un lien épidémiologique avec un cas confirmé ou avec une flambée. <p style="text-align: center;">- - -</p>	<p>الحالة المثبتة Cas confirmé Confirmed case</p>
---	---

<p>A suspected case acute onset of fever followed by jaundice within 2 weeks of onset of first symptoms with possible haemorrhagic manifestations and signs of renal failure</p> <ul style="list-style-type: none"> - With laboratory confirmation (in reference laboratory): <ul style="list-style-type: none"> - Isolation of yellow fever virus - OR presence of yellow fever specific IgM or a 4-fold or greater rise in serum IgG levels in paired sera (acute and convalescent) - OR positive post-mortem liver histopathology - OR detection of yellow fever antigen in tissues by immunohistochemistry - OR detection of yellow fever virus genomic sequences in blood or organs by PCR. - Or epidemiologically linked to a confirmed case or outbreak. 	
A95.9	رمز المرض ICD-10 / CIM-10

مدير عام وزارة الصحة العامة

الدكتور وليد عمّار

يبلغ:
مديرية الوقاية الصحية
مصلحة الطب الوقائي
وحدة الترصد الوبائي
دائرة مكافحة الأمراض الانتقالية
مصالح الصحة في المحافظات
أقسام الصحة في الاقضية
نقابيتي أطباء في لبنان والشمال
نقابة المستشفيات الخاصة
المحفوظات